

RI検査のご案内と注意事項

肺血流シンチグラフィ(^{99m}Tc -MAA)

【集積機序】

- ◆ 静脈投与後右心内で血流と完全に混合された後、肺の毛細血管床に捕捉されて一過性の微小梗塞を生じ、その分布は肺局所血流量に比例します。全体の0.2～0.3%が閉塞されると考えており、3～4時間で梗塞は解除されます。

【適応】

- ◆ 肺塞栓症、各種肺疾患の肺血流分布の評価

【禁忌事項】

- ◆ 右心側から左心側への血液シャントのあるチアノーゼを呈する患者
- ◆ 肺血流に高度の抵抗がある患者(肺高血圧症、膠原病等)

【注意事項】

- ◆ 肺血管床閉塞が広範囲ないし肺血管床狭窄が広範囲にあると考えられる患者は、呼吸困難、チアノーゼなどが増強することがあるので慎重投与となっています。

【お願い】

- ◆ お手数をおかけしますが、検査予約をされましたらRI検査のご案内と注意事項(患者様用)の下段にあります予約日時の箇所に
予約日時: ○月 ○日 ○時
をご記入いただき、患者様へお渡しをお願いいたします。

独立行政法人 国立病院機構 さいがた医療センター

・検査のご予約は

電話: 025-534-6735(地域医療連携室)

・検査に関するお問い合わせは

電話: 025-534-6738(放射線科直通)