

RI検査のご案内と注意事項

心筋交感神経シンチグラフィ+心筋血流シンチグラフィ($^{123}\text{I-MIBG}+^{201}\text{TlCl}$)
2核種同時収集

【集積機序】

- ◆ 心筋交感神経シンチグラフィ、心筋血流シンチグラフィの項をご参照ください。

【臨床的意義】

- ◆ 心筋血流シンチグラフィと対比して除神経領域(障害心筋の交感神経機能の脱落した領域)の検出。

【禁忌事項】

- ◆ 特にありません。

【注意事項】

- ◆ 食事をすると肝、胃、腸など消化管の集積が増加するので、検査の3時間以上前から食事をとらないようにご説明ください。水やお茶の摂取は可能です。
- ◆ 三環系抗うつ剤、レセルピン、塩酸ラベタロールを投与している場合は、心臓への集積が抑制されるとの報告があるので、検査の1週間前からの投与中止が望ましいとされています。

【お願い】

- ◆ お手数をおかけしますが、検査予約をされましたらRI検査のご案内と注意事項(患者様用)の下段にあります予約日時と2回目撮影時間の箇所に
予約日時: ○月 ○日 ○時
2回目撮影: 注射時間から3時間後
をご記入いただき、患者様へお渡しをお願いいたします。

独立行政法人 国立病院機構 さいがた医療センター

・検査のご予約は

電話: 025-534-6735(地域医療連携室)

・検査に関するお問い合わせは

電話: 025-534-6738(放射線科直通)